

Les problèmes de santé les plus courants et les plus graves associés à la violence entre partenaires intimes

La violence entre partenaires intimes (VPI) touche près de la moitié des femmes aux États-Unis à un moment ou à un autre de leur vie. Le Office of Women's Health (Bureau de la santé des femmes) de la Health Resources and Services Administration (Administration des ressources et services de santé) a demandé aux National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine de convoquer un comité multidisciplinaire d'experts afin d'identifier les services de soins de santé essentiels pour les femmes en cas de violence entre partenaires intimes dans des conditions persistantes, de déterminer les changements éventuels à apporter à cette liste en cas d'urgence de santé publique et de définir des stratégies visant à garantir que les femmes puissent accéder aux soins essentiels dans ces mêmes cas d'urgence de santé publique. Le rapport qui en résulte intitulé *Essential Health Care Services Addressing Intimate Partner Violence* (*Services de soins de santé essentiels pour lutter contre la violence entre partenaires intimes*), présente une feuille de route en vue du changement. Vous trouverez ci-dessous les problèmes de santé les plus courants et les plus graves associés à la VPI.

Lésions cérébrales traumatiques

Perte de mémoire, maux de tête, vertiges, crises d'épilepsie, trous de mémoire, difficultés de concentration, changements de comportement et d'humeur, troubles du sommeil, difficultés à penser et à organiser ses pensées, fractures du crâne

Problèmes de santé mentale et comportementale

Anxiété, dépression, stress post-traumatique, troubles liés à l'utilisation de substances, troubles de l'alimentation

Lésions dentaires

Dents cassées ou perdues

Problèmes de santé obstétricaux et périnataux

Hypertension artérielle, nausées sévères, vomissements, déshydratation, saignements vaginaux, infections rénales ou urinaires, prise de poids insuffisante de la mère, naissance prématurée, insuffisance pondérale à la naissance, fausse couche, pré-éclampsie, décès de nouveau-né, homicide d'une ou d'un partenaire intime

Lésions musculo-squelettiques

Fractures de l'avant-bras, de la main, des doigts, de l'omoplate, des côtes, de la clavicule, du sternum, du pied et de la cheville ; entorses et foulures ; arthrite ; maladies articulaires ; difficultés à se déplacer ou à marcher

Blessures par strangulation

Accident vasculaire cérébral ; lésions des principaux vaisseaux sanguins du cou ; fractures du cartilage de la gorge ; lésions des voies respiratoires ; lésions cérébrales dues au manque d'oxygène ; perte de la voix ou difficultés à parler ; crises d'épilepsie ; contusions ; lésions des os, des muscles et des ligaments du cou ; syndrome de stress post-traumatique

Blessures à la tête, au visage et au cou


Fractures faciales, en particulier du nez, du maxillaire (mâchoire) et des orbites (orbites oculaires) ; coupures ; ecchymoses ; autres lésions des tissus mous du visage, des yeux et des oreilles

Douleurs chroniques

Migraines ; maux de tête fréquents ; douleurs dorsales, pelviennes ou abdominales chroniques ; fibromyalgie

Problèmes de santé gynécologique et génésique

Douleurs pelviennes chroniques, infections sexuellement transmissibles, infection par le VIH, autres infections gynécologiques, grossesses non désirées ou répétitives rapides, pertes vaginales ou saignements inhabituels



Pour en savoir plus et accéder au rapport complet, consultez la page nationalacademies.org/intimate-partner-violence.

